



こどもの定期予防接種

予防接種法に基づいて実施している予防接種で、保護者には接種の努力義務があります。
接種に当たって、説明書や医師の説明をよく聞き、必要性や副反応について理解したうえで接種しましょう。

種 類	対 象 年 齢		標準的な接種年齢	接種回数	必須間隔および年齢
ロタウイルス	ロタリックス: 生後6週～24週0日		初回接種	2回	27日以上の間隔
	ロタテック: 生後6週～32週0日		生後2か月～出生14週6日	3回	
B 型 肝 炎	1歳未満		生後2か月～9か月未満	3回	27日以上の間隔で2回接種し、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回。
B C G (結 核)	1歳未満		生後5か月～8か月未満	1回	
五 種 混 合 ※1 (ジフテリア 百 日 せ き 破 傷 風 ポ リ オ H i b)	1 期	生後2か月～ 90か月未満	初回接種 生後2か月～7か月 ※1 20日～56日間隔	3回	20日以上の間隔
			追加接種 初回接種終了後 ※1 6か月～18か月あける	1回	初回接種終了後 6か月以上あけること
四 種 混 合 ※1 (ジフテリア 百 日 せ き 破 傷 風 ポ リ オ)	1 期	生後2か月～ 90か月未満	初回接種 生後2か月～12か月 20日～56日間隔	3回	20日以上の間隔
			追加接種 初回接種終了後 12か月～18か月あける	1回	初回接種終了後 6か月以上あけること
二 種 混 合 (ジフテリア 破 傷 風)	2 期	11歳～13歳未満	11歳	1回	
H i b ※1	生後2か月～ 5歳未満		初回接種 生後2か月～7か月 未満 で接種開始 27日～56日間隔	3回 ※2	27日以上の間隔 1歳未満までに 終了させること
			追加接種 初回接種終了後 7か月～13か月あける	1回	初回接種終了後 7か月以上あけること
小児用 肺炎球菌	生後2か月～ 5歳未満		初回接種 生後2か月～7か月 未満 で接種開始	3回 ※2	27日以上の間隔で2回 目を1歳未満、3回目を 2歳未満までに終了
			追加接種 初回接種終了後 60日以上あけて 生後12か月～15か月	1回	初回接種終了後 60日以上あけて 1歳以降に接種
麻 し ん (はしか)	1 期	生後12か月～ 24か月未満	1歳になったらなるべく早く	1回	
風 し ん (三日はしか)	2 期	5歳以上7歳未満で小学校就学前1年のもの		1回	
水 痘 (みずぼうそう)	生後12か月～ 36か月未満		初回接種 生後12か月～15か月	1回	
			追加接種 初回接種終了後 6か月～12か月あける	1回	初回接種終了後 3か月以上あけること

種 類	対 象 年 齢		標準的な接種年齢	接種回数	必須間隔および年齢
日 本 脳 炎 ※3	1	生後6か月～ 90か月	初回接種 3歳 6日～28日間隔	2回	6日以上の間隔
			追加接種 4歳 初回接種後おおむね1年	1回	初回接種終了後 6か月以上あけること
	2	9歳～13歳未満	9歳	1回	
HPV (子宮頸がん)		小学6年～高校1年 相当の年齢の女子	中学1年生 【サーバリックス接種】 2回目は1回目から1か月後 3回目は1回目から6か月後	3回	【ガーダシル、シルガード9(※4)接種】 2回目は1回目から2か月後 3回目は1回目から6か月後

- ※1 令和6年4月1日から、五種混合ワクチンが定期予防接種の対象となりました。
五種混合ワクチンを接種した場合、四種混合ワクチンおよびHibワクチンを接種する必要はありません。
標準的な接種年齢は国の通知等により変更する場合があります。
- ※2 Hib・小児用肺炎球菌は、初回接種の開始時期で接種回数が変わります。
- ※3 日本脳炎の定期予防接種が終了していない人への特例
平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人は、20歳未満まで特例があります。
- ※4 シルガード9の初回接種を15歳になるまでに受け、初回接種から2回目接種までの間隔を最低5か月以上□
空けて接種すると、2回で接種を完了することが可能です。